

AVISTREP

Solution injectable

Pénicilline G procaine + Sulfate de dihydrostreptomycine

COMPOSITION :

Chaque 1 ml contient :

Pénicilline G procaine 200 mg

Sulfate de dihydrostreptomycine 250 mg

Excipient..... q.s.p..... 1 ml

INDICATIONS :

AVISTREP, suspension injectable, est indiquée dans le traitement des infections causées par les micro-organismes sensibles à la pénicilline et/ou à la streptomycine, telle que :

Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Corynebacterium pyogenes, Klebsiella pneumonia, Listeria spp et Salmonella spp.

AVISTREP est efficace dans le traitement des maladies locales et systémiques causées par des organismes sensibles, notamment : les pneumonies, la listériose, la méningite ; la septicémie ; les entérites causées par la salmonellose et dans le contrôle des infections bactériennes secondaires. La combinaison de pénicilline et de dihydrostreptomycine est particulièrement efficace dans le traitement des infections mixtes impliquant à la fois des organismes Gram positifs et Gram négatifs.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

La dose quotidienne recommandée pour les camelins, les bovins, les chevaux, les ovins, les caprins et les chiens est de 1 ml d'AVISTREP par 25 kg de poids corporel correspondant à 8 mg de pénicilline procaine et 10 mg de sulfate de dihydrostreptomycine par kg de poids corporel. La dose doit être administrée une fois par jour par injection intramusculaire profonde pendant trois jours consécutifs.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats :

- **Bovins, ovins, camelins :** 23 jours.

- **Caprins :** 31 jours.

Lait : 3 jours

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

Garder le produit dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 30^{\circ}\text{C}$.

Validité après ouverture du flacon : 28 jours.

PRESENTATIONS :

Flacons de 50 et 100 ml.