

ANTALGINE

Dipyrone

Solution injectable

COMPOSITION :

Métamizole sodium monohydraté (Dipyrone) 50.0 g
Excipient q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

Réduction des douleurs d'origine viscérale en particulier celles associées à des spasmes.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Intraveineuse lente stricte, intramusculaire.

La voie intraveineuse sera préférée pour les interventions urgentes. Lors d'injection intramusculaire, il est préférable de répartir la dose totale en plusieurs points.

Equins : 23 à 46 mg de métamizole par kg de poids vif, correspondant à 5 à 10 ml de solution pour 100 kg de poids vif.

Bovins : 23 mg de métamizole par kg de poids vif, correspondant à 5 ml de solution pour 100 kg de poids vif.

Chiens, chats : 92,6 mg à 185,2 mg de métamizole par kg de poids corporel, correspondant à 1 ml de solution pour 2,5 à 5 kg de poids corporel.

L'effet du produit s'installe 5 à 10 minutes après l'injection pour persister pendant 1 heure environ.

Si les douleurs et l'état d'agitation de l'animal font leur réapparition après l'extinction de l'effet du produit, l'injection peut être répétée. En cas de renouvellements multiples de l'injection du produit, des métabolites à longue durée d'action vont s'accumuler; la posologie devra donc être réduite en conséquence.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats :

- Bovins : 18 jours.
- Equins : 15 jours.

Lait :

ne pas utiliser chez les femelles productrices de lait de consommation, en lactation ou en période de tarissement, ni chez les futures productrices de lait de consommation dans les 2 mois précédant la mise bas.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

* Garder le produit 2 ans dans son emballage commercial d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

* Stabilité après ouverture : 4 semaines dans son emballage commercial d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

PRESENTATIONS :

Flacon de 50 ml et 100 ml.