

ATLABUTAZONE

Poudre orale

Phénylbutazone

COMPOSITION :

Phénylbutazone 55.00 g
Excipient q.s.p. 100 g

INDICATIONS :

Traitement des phénomènes inflammatoires et douloureux chez les espèces cibles.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale, mélangé au son ou à des grains broyés aux doses suivantes :

- 1^{er} jour : 4,4 mg/kg de poids vif (½ cuillerée à café/150 kg) 2 fois/jour.
- 2^{ème} au 4^{ème} jours : 2,2 mg/kg de poids vif (1/4 cuillerée à café/150 kg) 2 fois/jour.
- 5^{ème} et 6^{ème} jours : 2,2 mg/kg de poids vif (1/4 cuillerée à café/150 kg) par jour.

Une cuillerée à café à ras correspond à 2.4 g de poudre.

Un protocole de traitement indicatif est présenté dans le tableau suivant :

	1 ^{er} jour	2 ^{ème} au 4 ^{ème} jours	5 ^{ème} et 6 ^{ème} jours
Cheval (450 kg)	1.5 cuillerée à café 2 fois par jour	3/4 cuillerée à café 2 fois par jour	3/4 cuillerée à café 1 fois par jour
Mulet (300 kg)	1 cuillerée à café 2 fois par jour	1/2 cuillerée à café 2 fois par jour	1/2 cuillerée à café 1 fois par jour
Ane (150 kg)	1/2 cuillerée à café 2 fois par jour	1/4 cuillerée à café 2 fois par jour	1/4 cuillerée à café 1 fois par jour

DÉLAI D’ATTENTE :

Viande et abats :

Ne pas utiliser chez les animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.

3 semaines après ouverture du contenant.

PRESENTATIONS :

Sachet de 10 g et flacon de 20 g.