

ATLADEX

Solution injectable

Dexaméthasone

COMPOSITION :

Dexaméthasone (s f. Phosphate sodique) 200 mg
Excipient q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

Chez les chiens et les chats :

Traitement des états inflammatoires, allergiques ou de choc.

Chez les bovins :

Traitement des états inflammatoires, allergiques ou de choc.

Traitement de la cétose primaire (acétonémie, toxémie de gestation).

Induction de la parturition.

Chez les équins :

Traitement des états inflammatoires ostéoarticulaires

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Posologies usuelles, mode et voie d'administration :

ATLADEX est indiquée par voie injectable (IV et IM) aux posologies suivantes :

Chiens et chats : 0,10 mg/kg (0,5 ml de solution/10 kg).

Equins, bovins : 0,06 mg/kg (0,3 ml de solution/10 kg).

- Traitement de la cétose primaire chez les bovins (acétonémie) : 0,02 à 0,04 mg de dexaméthasone/kg de poids vif, par voie IM, correspondant à la dose de 5 à 10 ml de produit en fonction de la taille de la vache et de la durée des signes. Si les symptômes se manifestent depuis longtemps ou en cas de rechute, des doses plus élevées (c'est-à- dire 0,04 mg/kg) peuvent être requises.

- Induction de la parturition chez les bovins : 0,04 mg de dexaméthasone/kg de poids vif correspondant à 10 ml de produit pour 500 kg de poids vif par voie IM en une seule fois au-delà du 260 jours de gestation.

Le vêlage intervient normalement dans un délai de 48 à 72 heures.

DÉLAI D'ATTENTE :

Bovins :

Viande et abats : 8 jours.

Lait : 3 jours.

Equins :

Viande et abats : 8 jours.

Lait : ne pas utiliser chez les juments productrices de lait destiné à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Validité après ouverture : 4 semaines après ouverture du contenant, dans l'emballage commercial et dans les conditions normales de conservation.

PRESENTATIONS :

Flacon de 50 ml et 100 ml.