

# ATLADIUREX

## Solution injectable

### Déxaméthasone + Hydrochlorothiazide

#### COMPOSITION :

Déxaméthasone (s f. Sodium phosphate) ..... 0.05 g  
Hydrochlorothiazide ..... 5.00 g  
Excipient ..... q.s.p. ....100 ml

#### INDICATIONS :

Congestion et oedème de la mamelle, persistance de l'oedème de lactation, oedème et congestion pulmonaires, Infiltrations oedémateuses des plaies chirurgicales, oedèmes des manifestations allergiques.

#### ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voies IV ou IM aux doses de 0,01 à 0,02 mg de déxaméthasone/kg de PV et 1 à 2 mg d'hydrochlorothiazide/kg de PV, correspondant à 2 - 4 ml de solution/100 kg, sans dépasser 10 ml pour les sujets adultes et 2 ml pour les jeunes veaux.  
Durée de traitement : 3 jours.

#### DÉLAI D'ATTENTE :

**Viande et abats :** 3 jours (IV), 6 jours (IM).

**Lait :** 2 jours (4 traites) en IV, 3 jours (6 traites) en IM.

#### CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température  $\leq 25^{\circ}\text{C}$ .  
Après ouverture : 4 semaines après la première ponction du flacon.

#### PRESENTATIONS :

Flacons de 20 ml, 50 ml et 100 ml.