

ATLAFLOR

Solution injectable

Florfenicol

COMPOSITION :

Florfenicol 30.00 g
Excipient q.s.p 100 ml

INDICATIONS :

Affections à germes sensibles au florfénicol.

Chez les bovins :

Traitement des infections de l'appareil respiratoire dues à Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida et Histophilus somni. La présence de la maladie dans l'élevage devra être établie avant le traitement.

Chez les ovins :

Traitement des infections de l'appareil respiratoire dues à Mannheimia haemolytica et Pasteurella multocida.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Chez les bovins :

Voie intramusculaire : 20 mg de florfénicol par kg de poids vif, soit 1 ml de solution pour 15 kg de poids vif, 2 fois à 48 heures d'intervalle.

Voie sous-cutanée : 40 mg de florfénicol par kg de poids vif, soit 2 ml de solution pour 15 kg de poids vif, une seule fois.

Le volume administré ne doit pas excéder 10 ml par site d'injection.

L'injection doit être réalisée au niveau du cou de l'animal.

Chez les ovins :

Voie intramusculaire : 20 mg de florfénicol par kg de poids vif, soit 1 ml de solution pour 15 kg de poids vif, par jour pendant 3 jours consécutifs.

Le volume administré ne doit pas excéder 4 ml.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats :

Bovins : 30 jours (voie intramusculaire), 44 jours (voie sous-cutanée).

Ovins : 39 jours.

Lait :

Ne pas utiliser chez les femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 25^{\circ}$ C.

4 semaines après ouverture du flacon.

PRESENTATIONS :

Flacons de 20 ml, 50 ml, 100 ml et 250 ml.