

ATLAFLUNEX

Solution injectable

Flunixinine

COMPOSITION :

Flunixinine (sf. de méglumine) 5 g
Excipient q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

Chez les équins :

- Traitement des inflammations et soulagement des douleurs associées aux affections musculo-squelettiques en particulier dans la phase aiguë.
- Soulagement des douleurs viscérales associées aux coliques.

Chez les bovins :

- Traitement des inflammations aiguës associées aux maladies de l'appareil respiratoire.
- Traitement adjuvant des endotoximies.
- Traitement adjuvant des mammites.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Chez les chevaux :

Traitement des inflammations et soulagement des douleurs associées aux affections musculo-squelettiques en particulier dans la phase aiguë : 1,1 mg de flunixinine par kg de poids vif et par jour, correspondant à 1 ml de solution pour 45 kg de poids vif, par voie IV pendant 1 à 5 jours consécutifs.
Soulagement des douleurs viscérales associées aux coliques : 1,1 mg de flunixinine par kg de poids vif, correspondant à 1 ml de solution pour 45 kg de poids vif, par voie IV, le traitement peut être renouvelé 1 ou 2 fois si la colique réapparaît.

Chez les bovins :

2,2 mg de flunixinine par kg de poids vif et par jour, correspondant à 2 ml de solution pour 45 kg de poids vif, par voie IV ou IM pendant 1 à 3 jours consécutifs.

DÉLAI D'ATTENTE :

Equins :

Viande et abats : 10 jours.

Lait : ne pas utiliser chez les juments en lactation productrices de lait destiné à la consommation humaine.

Bovins :

Viande et abats : 10 jours (voie IV)/31 jours.
(voie IM).

Lait : 24 heures (voie IV)/36 heures.
(voie IM).

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température ≤ 25 °C.
Après ouverture : 4 semaines après la première ponction du flacon.

PRESENTATIONS :

Flacons de 20 ml, 50 ml et 100 ml.