

TILCOSIL

Solution orale

Tilmicosine 25%

COMPOSITION :

Tilmicosine (s f. de phosphate) 25.00 g
Excipients q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

Traitement et prévention des infections respiratoires causées par *Mycoplasma gallisepticum*, *M. Synoviae* et autres germes sensibles à la Tilmicosine.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

A incorporer dans l'eau de boisson à la concentration de 75 mg de Tilmicosine par litre (30 ml de TILCOSIL par 100 litres) pendant 3 jours. Ceci correspond à une dose quotidienne approximative de 15 à 20 mg/kg pour les poulets et de 10 à 27 mg/kg pour la dinde. Le traitement peut aussi être appliqué plus tard, après la première semaine, et aux moments de stress en suivant le même dosage pendant 24 à 48 heures.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats :

Poulet : 14 jours.

Dinde : 19 jours.

OEufs : ne pas administrer aux pondeuses dont les oeufs sont destinés à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Validité après ouverture du flacon : 4 semaines.

Validité après mise en solution : 6 à 8 heures.

PRESENTATIONS :

Flacons de 100 ml, 250 ml, 500 ml 1 litre, 2 litres et 5 litres.