

TRIDOX

Solution injectable

Sulfadoxine + Triméthoprine

COMPOSITION :

Sulfadoxine 20.00 g
Triméthoprine 4.00 g
Excipients q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

TRIDOX est indiqué, essentiellement dans le traitement des infections respiratoires, digestives, uro-génitales et dégitées dues aux germes sensibles à la sulfadoxine et au triméthoprine.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Dosage : 15 mg de l'association TMP/SDX /kg PV (12,5 mg de SDX et 2,5 mg de TMP par kg PV, ou 1 ml du produit /16 kg PV).

Voies d'administration :

Bovins, ovins et caprins : voies intramusculaires ou intraveineuses lente.

Equins : voie intraveineuse.

Durée : 5 jours au maximum ou au moins 2 jours après la disparition des symptômes.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viande et abats : 10 jours.

Lait : 4 jours.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Stabilité après ouverture : 4 semaines.

PRESENTATIONS :

Flacons de 20 ml, 50 ml, 100 ml.