

ZURICOX

Solution orale

Toltrazuril

COMPOSITION :

Toltrazuril 2.50 g
Excipient q.s.p. 100 ml

INDICATIONS :

Prévention et traitement des coccidioses aviaires dues à *Eimeria acervulina*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. maxima* et *E. mitis* chez le poulet et à *E. adenoides* et *E. meleagritidis* chez la dinde.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale dans l'eau de boisson à la posologie suivante :

Posologie de base : 7 mg de principe actif/kg de poids vif/j, soit 28 ml de solution ZURICOX par 100 kg par jour pendant 2 jours consécutifs.

Prévention : avant des périodes à haut risque (stress, vaccination, transport) en administration stratégique de 2 jours consécutifs.

Traitement : administration pendant 2 jours consécutifs en présence ou en absence d'anticoccidiens dans l'aliment.

DÉLAI D'ATTENTE :

Viandes et abats : 12 jours

OEufs : Ne pas utiliser chez les pondeuses dont les oeufs ou leurs dérivés sont destinés à la consommation humaine.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DÉLAIS DE VALIDITÉ :

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et à une température $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Après ouverture : 3 semaines.

Après mise en solution : 6 à 8 heures.

PRESENTATIONS :

Flacons de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litres et 5 litres.